

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАРИМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ»

г. Астрахань, 414050, ул. Тольятти, 74
Тел/ факс: (8512) 49 95 35
E-mail: nariman_vetstan@mail.ru

От 31.10.2023 № 478
на № _____ от _____

Главам МО поселений
Наримановского района

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о распространении в 2023 году экзотического для Российской Федерации вириуса ящура серотипа SAT-1 (South Africa Territories 1) за пределы Африканского региона, обнаружения заболевания на территории Ближнего Востока.

Выявленный вириус ящура идентифицирован как тип SAT-1 (South Africa Territories 1), топотип 1. Данный тип SAT-1 вместе с типами O, A и SAT-2 являются доминирующими на территории стран Африки в последние десятилетия. Отмечается, что в 2023 году ни одна из стран Африки официально не информировала ВОЗЖ о выявлении вириуса ящура серотипа SAT-1.

Ряд государств региона являются эндемичными по заболеванию (типы A, O, Азия-1), из ряда стран официальная информация не направляется в ВОЗЖ на протяжении десятилетий. В некоторых странах не организована противоэпизоотическая работа на государственном уровне.

Учитывая изложенное, вероятно стремительное распространение ящура серотипа SAT-1 на Ближнем Востоке, в Турции и сопредельных с Российской Федерацией странах.

На основании изложенного с целью недопущения распространения ящура типа SAT-1 на территории Российской Федерации необходимо обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам профилактики через социальные сети, средства массовой информации.

Приложение: памятка для населения 2 л в 1 экз.

Начальник учреждения

Н.Ю. Апшарова

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА

Ящур — вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и переболеваюят тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и люди.

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ — больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов.


Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна передача инфекции при доении, уходе, лечении, убое, воздушно-капельный путь заражения, а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;
2. Усилить охрану животноводческих ферм, установить на них строгий ветеринарно-санитарный режим и режим содержания и эксплуатации животных;
3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
4. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
5. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
6. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
7. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

Памятка для населения по профилактике ящура животных



ЯЩУР – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных. Инфекция передается:

Клинические признаки заболевания:

наличие везикул и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

Фактор передачи продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.
Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.

вируса:

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящером восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;
- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. От человека к человеку инфекция не передается. Распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

Для профилактики ящура специалистами ветеринарной службы Астраханской области проводится вакцинация восприимчивых животных против ящура раз в 6 месяцев вакцинами согласно инструкциям по их применению.